AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-S-6-82981180

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"
(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL
34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL
Régisseur de recettes de la D.D.A
C.C.P. Montpellier 5238-57

13 MAI 1982

Destiné aux agriculteurs du LAURAGAIS

AVERTISSEMENT N° 5

(rédigé en collaboration avec la ferme de LOUDES, les GVA les CIVAM de l'Aude et l'ITCF)

TRAITEZ

- LA ROUILLE BRUNE est toujours présente.

Les variétés les plus touchées sont : CATON, DARIUS, TALENT, MONDUR CASTAN, ROAZON, le TOP est à surveiller.

Les régions les plus concernées sont le sud et l'est du LAURAGAIS. Nous constatons une évolution dans la Piège mais il n'y a pas encore de cas graves dans cette région.

Nous vous rappelons que vous devez TRAITER lorsque vous observez des pustules de rouille brune sur la F1, et la F2 (les 2 dernières feuilles sous l'épi).

Intervenez soit avec :

. *Tilt C* *1 litre/hectare*

ou . *Vigil K* *1,25 litre/hectare*

le soir ou le matin de préférence - volume de bouillie 500 litres/hectare.

- LA ROUILLE JAUNE : quelques foyers ont été découverts à Pexiora St Martin Lalande sur Talent, à Revel sur Agathe.

Vous devez observer les champs en les parcourant en travers et traitez en cas de présence de cette maladie.

Mêmes produits et mêmes doses que pour la Rouille Brune.

- LES PUCERONS Des champs en pleine épiaison sont atteints par ces ravageurs.

Le seuil d'intervention est le suivant : 1 épi sur 2 colonisé par au moins 5 pucerons.

Traitez avec *Pirimor G à raison de 250 g de produit commercial par hectare.*

Nous vous rappelons que cette spécialité peut être mélangée au *Vigil K ou au Tilt C.*

P29

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Place Chaptal MONTPELLIER - Le Directeur G. THEISSEN Nº d'inscription P.P. 531 A D

SURVEILLEZ

- VOS CULTURES

- LES PREMIERS CHAMPS QUI ONT DEJA ETE TRAITES

et renouvellez l'application en cas de réapparition de la **Rouille Brune sur la Fl et la F2.**
(dans ce cas les pustules doivent être bien vivantes).
Consultez votre technicien, la ferme de Loudes ou la P.V en cas de doute.

NE TRAITEZ PAS

- LA SEPTORIOSE

Nous ne constatons aucune évolution de cette maladie.

- LES CULTURES DE GALLA

Cette variété est particulièrement saine.

- SI VOS CULTURES NE SONT PAS AUX SEUILS INDIQUES DANS LES RUBRIQUES CI-DESSUS.

N.B. les stades de développement du blé ont été établis d'après KELLER (bulletin N°4)

Tirage du 13 mai 1982 - 1100 exemplaires